



Voederbeperking vleeskonijnen

Rantsoeneren

- Rantsoeneren vanaf 15.00 uur tot 3.00 uur, daarna hebben de konijnen nog ongeveer 2 à 3 uur om de voederbakken leeg te eten, overigens is deze periode sterk afhankelijk van de omstandigheden op het bedrijf.

Op deze manier kan de verzorger, die iedere dag op een vast tijdstip in de stal komt, de voederbakken controleren. Indien geconstateerd wordt dat de bakken (te) leeg of juist nog te vol zijn, stel dan de voermachine opnieuw in door het tijdstip dat de voermachine s'avonds aangaat te vervroegen of verlaten.

Wegen is een must

- Minimaal 2 keer per week 3 tot 5 % van de konijnen wegen. Hiervoor heeft Victoria Mengvoerders een gewichtcurve beschikbaar (te bekijken op het konijnenportaal onder; Konijnenhouderij; Voeding; Weegprogramma vleeskonijnen).
Als de gewichten onder de curve zitten wordt de voertijd verlengd. Als de gewichten van de vleeskonijnen daar boven zitten dan de voertijd verkorten. Wegen bij voorkeur in de middag, dan hebben alle konijnen ongeveer dezelfde voerhoeveelheid in de maag.

Waarom rantsoeneren?

- Het voederverbruik wordt lager als de konijnen s'nachts worden gevoerd in plaats van overdag.
 - De reden hiervoor is niet precies bekend, mogelijke reden zou kunnen zijn dat s'nachts eten beter aansluit bij de natuur van het konijn.
 - Door een betere vertering zal de voerconversie verbeteren.
- Hoger eindgewicht van de vleeskonijnen.
 - Bij het verstrekken van voer in de nacht in plaats van overdag: de temperatuur in de stal is lager, daardoor zullen de konijnen beter blijven eten, zeker in de zomer.
- Rantsoeneren heeft een lager medicijngebruik tot gevolg.
 - Doordat de konijnen door middel van rantsoeneren hun voer beter verteren is de gezondheid van de dieren beter.