

Het huisvesten van vleeskonijnen in parken



Ministerie van Economische Zaken



Het huisvesten van konijnen in diervriendelijke systemen staat volop in de belangstelling. Sinds enige tijd worden in de praktijk vleeskonijnen in parken gehuisvest. Parken bieden de vleeskonijnen meer ruimte en verrijking dan de traditionele kooien of de welzijnskooien, waardoor de konijnen meer soorteigen gedrag kunnen uitvoeren. Echter, onderzoek en ervaring op praktijkbedrijven laten zien dat de groei- en voederomzetting in parken circa 4-5% minder gunstig zijn dan bij kooihuisvesting. Daarnaast is er kans op verhoogde uitval in parken door darmproblemen (enteropathie), die groter wordt naarmate er meer rondes worden gehouden in de parken. Vanuit het onderzoek en de praktijk zijn inmiddels ervaringen opgedaan met inrichting van de parken en management. Hiermee kunnen problemen (deels) worden ondervangen.

Parkinrichting

De uitvoering van het park moet een goede combinatie waarborgen van comfort voor de dieren, een optimale hygiëne en arbeidstechnisch comfort voor de konijnenhouder.

- Beperk de afmeting van het park tot circa 1 meter diepte en maak de vloer van het park op werkhoopte. Controle van de dieren, vangen van de dieren evenals het reinigen van de parken is hierdoor vrij eenvoudig. Eén zijde van het park dient tenminste 1.80 m te zijn om van een park te mogen spreken.
- Zorg ervoor dat er geen plaatsen in het park zijn waar de konijnen zich kunnen vastlopen en geen vluchtmogelijkheid hebben. Hierdoor kunnen de dieren confrontaties uit de weg gaan of vluchten voor een agressieve soortgenoot.
- Biedt vluchtmogelijkheden aan in de vorm van bijvoorbeeld schotten en/of pvc-pijpen (die zijn vastgemaakt), zodat dieren uit het zicht kunnen komen van elkaar.
- Een doorlopend plateau over de gehele lengte biedt een goede verrijking en schuilplaats in het park.
- Bij plasticroostervloertypes is knaagbestendigheid zeer belangrijk maar ook het grondig kunnen reinigen en ontsmetten is een voorwaarde. Laat een rand van gaas van minstens 1-2 cm langs de kanten, zodat zich hier geen keutels kunnen ophopen.
- Ideaal is als het plateau en de plasticroostervloer naar boven opgeklapt kunnen worden zodat ze onderaan perfect gereinigd en ontsmet kunnen worden.



Vluchtmogelijkheden in de vorm van bijvoorbeeld schotten en/of pvc-pijpen (die zijn vastgemaakt), zodat dieren uit het zicht kunnen komen van elkaar.

- Knaagmateriaal en ruwvoer moeten hygiënisch aangeboden worden. Geperste blokken van stro of hooi die slechts onderaan aangeknaagd kunnen worden voldoen hiervoor en verhinderen grote morsverliezen en problemen in het uitmeststelsel. Maar het materiaal moet wel goed bereikbaar en beknaagbaar zijn.
- Ieder park moet uitgerust zijn met minstens 2 drinknippels en circa 1 voederplaats/4 konijnen.

Management

- All-in all-out met grondige reiniging en ontsmetting na iedere ronde en een voederbeperking tijdens de eerste weken na spenen hebben hun efficiëntie bewezen bij kooihuisvesting om de uitval ten gevolge van enteropathie te beheersen. Ook bij parkhuisvesting zijn deze punten van belang.
- De voederbeperking is het eenvoudigst uit te voeren door de dieren slechts 8 uur per dag voer te laten opnemen vanaf het spenen tot circa 8-9 weken.
- Bij een beperkte groepsgrootte (en parkgrootte) van circa 25 tot 40 konijnen is het eenvoudig om de dieren te vangen, vluchten ze minder in hoeken op elkaar en is er minder risico op vechtpartijen in de periode vlak voor afleveren.
- Bij parkhuisvesting loopt het risico op vechtpartijen sterk op vanaf de leeftijd van 11 weken. De inzet van een snelgroeiende vaderlijn zorgt ervoor dat konijnen op die leeftijd vlot 2,5 kg halen en dus eerder afgeleverd kunnen worden.
- Als de konijnen 's nachts afgeleverd moeten worden, wen ze dan aan deze situatie door enkele dagen op voorhand het lichtschema aan te passen.
- Bij plastic roostervloeren is het gevaar voor coccidiose en versterking van de enteropathieproblemen groter. Een goede hygiëne, opvolging van de coccidiosestatus en/of tijdige behandeling via voer of drinkwater is noodzakelijk.

Delen van ervaringen

Dit zijn ervaringen met parken voor vleeskonijnen uit het onderzoek en op praktijkbedrijven. Ze zijn niet breed uitgetest. Ze geven een eerste aanzet voor handvatten ondernemers die in de praktijk aan de slag willen gaan met parken voor vleeskonijnen.

We doen een oproep om uw ervaringen met ons en uw collega's te delen, zodat niet ieder het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Ook van elkaars fouten kunnen we leren. Dit document kan groeien door uw ervaringen er aan toe te voegen. U kunt uw ervaringen mailen naar jorine.rommers@wur.nl of luc.maertens@ilvo.vlaanderen.be



Knaagmateriaal en ruwvoer moeten hygiënisch aangeboden worden.



Een doorlopend plateau over de gehele lengte biedt een goede verrijking en vluchtmogelijkheid in het park.

Contact

Wageningen UR Livestock Research
Postbus 65
8200 AB Lelystad
www.wageningenUR.nl

Luc Maertens
T +32 (0) 9 272 26 21
E luc.maertens@ilvo.vlaanderen.be

Jorine Rommers
T 0320 29 35 09
E jorine.rommers@wur.nl

